

Isod, mae rhai o'r ffurfiau cyffredin o fioreolaeth sydd ar gael mewn cnydau o ffrwythau meddal. Er mwyn eu defnyddio'n effeithiol, dylech holi un o gynghorwyr hyfforddedig Cynllun Arolygu Safonau Agrocemegol Prydain (BASIS) ynghylch sut i fynd i'r afael â nhw.



Ar ôl i chi dderbyn cynnyrch bioreoleth, mae'n well eu defnyddio'n syth. Peidiwch ag oedi cyn eu defnyddio. Cadwch y cynnyrch mewn lle sych yn unol â chyfarwyddiadau'r label. Mae angen cadw'r rhan fwyaf o'r pecynnau ar i fyny er mwyn gwneud yn siŵr eu bod wedi cymysgu'n dda.

Mae'r Orius yn ysglyfaethwr cyffredinol sy'n bwyta amrywiaeth eang o blâu. Dyma un o'r ychydig drychfilod bioreolaeth sy'n bwyta 'thripiau' oedolion. Mae'n gallu datblygu'n dda ar gnydau sydd â chyfoeth o baill. Gall gymryd rhwng 4 ac 8 wythnos i ddatblygu poblogaeth.



Orius oedolyn yn bwyta thripiau

Cyfraddau goroesi (Ysgafn/ Trwm): **3.5 pob m²/ 5-10 pob m²**



Cymysgedd cludo Orius sy'n dod yn y mwyafrif o becynnau

- Rhowch y cymysgedd mewn clwstrw o 70-100 unigolyn gan y bydd yn annog bridio a chynnydd mewn poblogaeth. Mae'n well peidio ag amharu arnynt am ychydig ddyddiau ar ôl eu rhoi yno.
- Mae'r Orius yn dodwyr rhan fwyaf o'i wyau ar egin ochr. Mae'n well ei roi ar ôl tynnu'r egin ochr o'r cnwd.
- Ni ddylid defnyddio'r dulliau ataliol cyn i'r blodau cyntaf agor gan eu bod angen paill i oroesi heb ysglyfaethwr.
- Rhowch y cymysgedd ar fore braf neu'n hwyr yn y prynhawn er mwyn osgoi golau haul llachar.

Mae'r *Amblyseius cucumeris* (sy'n cael ei adnabod yn wyddonol fel *Neoseiulus cucumeris*) yn ysglyfaethwr cyffredinol sy'n gallu byw ar bailll. Mae'n dda iawn am ymosod ar wyau, gwiddon a thripiâu larfaol.



Amblyseius cucumeris ar ddeilen (Llun ©Bioline)

Cyfraddau Goroesi (Ysgafn/ Trwm): **250 – 500 pob m²/**
250-500 pob m²



Enghraifft o ddull gwasgaru drwy fagiau bach

Mae gwiddon ysglyfaethus yn targedu amrywiaeth eang o rywogaethau o thripliau ond dylid nodi eu bod ond yn targedu'r wyau a'r larfâu, nid oedolion. Maent yn lledaenu drwy'r cnwd drwy ddail/coesau sy'n cyffwrdd ei gilydd. Mae'r gwiddon yn gallu bwyta paill ynghyd â phlâu er mwyn galluogi dull ataliol pan na fydd plâu. Mae bagiau bach o widdon ysglyfaethus yn gweithredu fel unedau bridio sydd â ffynhonnell bwyd ac maent yn rhyddhau llif gyson o widdon dros ychydig wythnosau.

Gwenyn meirch parasitaidd.

Mae gwenyn meirch parasitaidd (ysglyfaethwr parasitaidd) yn dodwy wy y tu mewn i bryfed gleision. Pan fydd yr wy yn deor bydd yn bwyta'r pry glas gan adael mymi ar y ddeilen. Mae'n chwileru ac yna'n ymddangos yn barod i heintio rhagor o bryfed gleision.



Aphidius- Rhywogaeth o ysglafaethwyr parasitaidd ger pryf glas

Mymi (Iliw aur) ar ddeilen.

Maint: **2-4mm**

Bwyd: **Neithdar**

Tymheredd Uchaf: **Llai na 28°C**


Cyfraddau Atal: **0.25 pob m²**

Cyfraddau Goroesi (Ysgafn/ Trwm): **1 pob m²/ 2 pob m²**

- Mae rhywogaethau parasitaidd ond yn targedu rhywogaethau penodol o bryfed gleision, felly mae'n bwysig gwybod pa rywogaeth o bryfed gleision rydych chi'n eu hwynebu.
- Mae llawer o gynnyrch yn gymysgedd o rywogaethau parasitaidd i helpu i gynnwys rhywogaethau gwahanol o bryfed gleision, ond darllenwch y sylw'n ofalus.
- Gan eu bod yn gallu hedfan, mae'r gwenyn meirch yn gallu symud drwy'r cnwd yn rhwydd gan ganolbwyntio ar fferonomau sy'n cael eu rhyddhau gan y planhigyn y mae'r pryfed gleision yn ymosod arno.
- Er mwyn sicrhau'r dull ataliol gorau, dylid rhoi ychydig ohono'n wythnosol yn ystod y cyfnodau pan mae nifer helaeth o bryfed gleision.

Nematodau spp.- *Steinernema feltiae* neu *Steinernema kraussei*

Mae'r nemotodau hyn yn barasitiaid sy'n symud drwy ardal y pridd ac yn heintio'r ysglyfaethau. Nid ydynt yn achosi niwed i gnydau gan eu bod ond yn ymosod ar y plâu dewisol.



Enghraifft o nematodau mewn daliant

Enghraifft o nematodau sych mewn pecynnau

Maint: **<0.1mm**

Bwyd:

***Steinernema feltiae* - Pryfed Sciarid, larfâu thripau.**

***Steinernema kraussei* - Gwiddon gwinwydden du**

Tymheredd Uchaf: **14-28°C**

Lleithder gorau posibl: **Lleithder Uchel.**

- Mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod y nematodau wedi'u cymysgu'n dda yn y tanc er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gwasgaru'n deg dros y cnwd.
- Mae'r nematodau'n teithio drwy leithder y pridd, os yw'r pridd yn rhy sych, ni fydd mor effeithlon oherwydd bydd y nematodau'n cael trafferth gweithredu.
- Mae'r nematodau'n lleoli eu hysglyfaeth yn ôl eu cynnyrch gwastraff ac yn eu heintio drwy agoriad corff.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefannau Bioline, Biobest neu Koppert:

<https://www.biobestgroup.com/> <https://www.biolineagrosciences.com/>,
<https://www.koppert.co.uk/>